

MEDICOM´S spol. s r.o.

Zdravotnické zařízení
M. Majerové 2, Prostějov
Tel.: 582 341 336, 582 302 970
Mobil: 736 675 801
E-mail: jednatel@medicoms.cz

MEDIHOPE spol. s r.o.

Zdravotnické zařízení
M. Majerové 2, Prostějov
Tel.: 582 341 336, 582 302 970
Mobil: 736 675 801
E-mail: medihope@medihope.cz

Žádost o předoperační vyšetření

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

prosíme Vás o předoperační vyšetření u pana/paní

datum narození

k plánované operaci v režimu jednodenní chirurgie dne

Potřebná předoperační vyšetření nutná k provedení operace:

MALÉ OPERAČNÍ VÝKONY

Laskavě žádáme praktického lékaře a pediatra o provedení následujícího:

- Anamnéza, v rámci farmakologické anamnézy: medikace včetně gramáže a dávkování, fyzikální vyšetření
- Krevní obraz
- Ionty – Na, K, Cl
- QUICK, aPTT, INR
- Glykémie
- ALT, AST
- Urea, kreatinin
- RTG plic + popis – nad 60 let
- EKG + popis – nad 40let, křivku prosím přiložte k ostatní dokumentaci
- Moč – chemicky + sediment
- Doplnková vyšetření dle onemocnění pacienta (DM – diabetologické, převedení na krátkodobě působící inzulin; CHOPN – spirometrické; srdeční vady – kardiologické, echo srdce apod.).
- Vyznačit ASA klasifikaci

Anopyrin a jiné léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno vysadit minimálně 7 dnů před výkonem. Pacienty, kteří léčbu potřebují, je nutno převést na jiný lék, např. Ibustrin, nízkomolekulární heparin. Perorální antidiabetika („prášky na cukrovku“) vysadit 24 – 48 hodin před operací (vždy v konzultaci s diabetologem) a v případě potřeby převést na krátkodobě působící inzulin.

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací.

Prosím berte na vědomí, že pacienti s nekompletním vyšetřením, zhoršeným základním onemocněním (např. hypertenzí, jiným onemocněním srdce, cukrovkou, onemocněním plic, ledvin), infekčním ložiskem jinde na těle, infekcí, otevřenou ranou či s výsledky vyšetření mimo referenční meze nemohou být k operaci přijati.

Děkujeme za spolupráci.

Jmenovka + podpis lékaře

Kritéria k indikaci pacienta do režimu jednodenní chirurgie.

1. Pacienti s rizikem **ASA I** jsou přijímáni **bez omezení** (tj. pacienti bez organického onemocnění kromě chirurgické indikace) = zdravý pacient.
2. Pacienti s rizikem **ASA II** (dobře kompenzovaná choroba z níže uvedené tabulky) jsou přijímáni **bez omezení**, pokud nevyžadují předoperační přípravu. Např. dobře kompenzovaná hypertenze, dlouhodobě dobře kompenzovaná substituce štítné žlázy apod.
3. Pacienti s rizikem ASA II vyžadující předoperační přípravu, nebo pacienti, u kterých se předpokládá předoperační příprava, jsou přijímáni **s vyšetřením odpovídajícího specialisty** a s doporučením předoperační přípravy (včetně vyloučení této přípravy).
4. Pacienti s rizikem **ASA III a více** jsou pro režim jednodenní chirurgie **kontraindikováni!**

Riziko ASA III a více představují nemocní s kombinací nejméně dvou v tabulce uvedených onemocnění, nebo jednoho špatně kompenzovaného.

| Dýchací systém | Srdce a oběh | CNS | Ostatní |
|--|---|---|---|
| Recidivující infekce (včetně operů rtů) Chron. bronchitida Astma bronchiale Plicní emfyzém Fibróza plic Tumory bronchů Tuberkulóza Pooperační apnoe | Hypertonie Hypotonie ICHS Srdeční infarkt Srdeční selhání Chlopňová vada (stp. embolii) Cor pulmonale Myokarditis Poruchy srdečního rytmu CABG (by-pass) | Cévní choroby mozku Apoplexie Mozkolebeční trauma Mozkový tumor Epilepsie Nemoci míchy | Adipozitas permagna Chron. Insuficience ledvin Nemoci jater Diabetes mellitus Nemoci štítné žlázy Nemoci nadledvin Myastenia gravis Myopatie Refluxní nemoc Psych. Nestabilita Herpes zooster |

Mimo výše uvedené nemoci je nutno konzultovat kombinaci několika dobře kompenzovaných chorob, včetně chorob v tabulce neuvedených, které mohou vyžadovat následnou péči na JIP, nebo sledování delší než 24 hodin, nebo stav, který by mohl generovat následnou hospitalizační péči (např. pokročilé těhotenství s možnou provokací porodu, výkony – nejčastěji z ORL indikace, které by mohly následně vyžadovat intubaci aj.).

V případě jakékoliv nejasnosti je lépe pacienta poslat ke konzultaci několik dnů před plánovaným výkonem, po objednání na telefonním čísle 582 302 970, 730 150 909.

Poznámka: Pokud pacient dlouhodobě bere léky, které jsou nezbytné ke kompensaci chronické choroby, vezme si je i v den operace (např. substituce tyroxinu, léky na hypertenzi, anti-arytmika, anti-astmatika apod.), pokud tyto nevyločí z předoperační přípravy příslušný ambulantní specialista.